

“USO AGRICOLA”

CERTIS

CYD - X

Virus de la granulosis de *Cydia pomonella*
Insecticida Microbial
Suspensión Acuosa

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

INGREDIENTE ACTIVO	% EN PESO
Virus de la granulosis de <i>Cydia pomonella</i> (Equivalente a 10 g de i.a./L o CpGV 2.2 x10 ¹³ virus granula/L.)	1.0
INGREDIENTES INERTES: Diluyentes y Coadyuvantes	99.0
TOTAL	100.0

REG. RSCO-INAC-0103W-301-008-001
CONTENIDO NETO:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo por el contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Lote No:
Fecha de fabricación: AA/MM/DD
Fecha de Caducidad: 2 años después de la fecha de elaboración

Titular del Registro, importado y distribuido por
CERTIS AGRO MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP 101, BOSQUES DE LAS LOMAS,
DELEGACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 11700, C. DE MEXICO, TEL.
(55)5596 5707

CERTIS

“HECHO EN ALEMANIA”

PRECAUCIÓN

Pantone azul (293-

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Lea cuidadosamente la etiqueta. No coma, beba o fume cuando esté manejando el producto. Use el equipo de protección adecuado contra polvos, guantes y overol. Evite inhalar la aspersión durante la aplicación o preparación de la mezcla. No permita que durante la aplicación, el rocío caiga sobre la piel. Después de un día de trabajo, báñese, cámbiese y use ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE MANIPULANDO ESTE PRODUCTO.”
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.”
- “MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”
- “NO MANIPULE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.”

“PRIMEROS AUXILIOS”

Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos durante 10 minutos con agua corriente. Si hubo derramamiento sobre la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y quite la ropa contaminada a la persona intoxicada. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente, introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia salada.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”

GRUPO QUIMICO: Insecticida Microbial

SINTOMAS DE INTOXICATION:

En caso de ingestión pueden presentarse síntomas de diarrea, vómito y dolor de cabeza.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO:

No tiene antídoto específico en caso de intoxicación proporcione tratamiento asintomático

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.”

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS.”
- “MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.”
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO.”
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACION”

GARANTÍA: CERTIS AGRO MEXICO S. DE R.L. DE C.V. garantiza la calidad del producto, siempre que el usuario lo adquiera dentro del envase original cerrado. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños que pudieran derivar del almacenamiento o aplicación inadecuados o que no se ajusten a las instrucciones. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de protección al Consumidor.



(793.C)

Pantone azul

“USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

**INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

CYD – X, Suspensión Acuosa, es un insecticida microbial a base del virus de la granulosis de *Cydia pomonella*.

Se recomienda para el control de la palomilla de la manzana *Cydia pomonella* en la producción orgánica y en programas de manejo integrado.

Viene preparado como suspensión acuosa lista para mezclarse con agua.

CULTIVOS PLAGAS Y DOSIS:

CULTIVO	Plagas, Nombre Común Y Nombre Científico	Dosis ml/100 L de agua	Observaciones
Manzano Peral	Palomilla de la Manzana <i>Cydia pomonella</i>	30	Realizar la primera aplicación al momento de la eclosión de las primeras larvas. Para el monitoreo es recomendable usar trampas con feromonas. El mejor momento de aplicación es al inicio de eclosión de las larvas. En caso de ser necesario realizar de 2-3 aplicaciones a intervalos de 8-10 días. Volumen de agua a utilizar 1000 a 1500 L/Ha

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN.

Agitar el producto antes de vaciar en el equipo de mochila manual o motorizada o al equipo de tractor para aplicar en aspersión o nebulización. Verificar que no haya precipitación en el tanque para evitar taponamientos de boquillas y aplicaciones irregulares. Se recomienda calibrar el equipo antes de su uso para obtener un buen cubrimiento del follaje.

MODO DE ACCIÓN:

CYD - X es un insecticida microbial específico de origen natural que actúa por ingestión. Actúa sobre las larvas de la palomilla de la manzana la cual al ingerir el producto se enferma con lo que se denomina como granulosis matando a las larvas de *Cydia pomonella* en aproximadamente 7 días.

CONTRAINDICACIONES:

Evite aplicaciones cuando este lloviendo o se esperen estas en los siguientes 30-60 minutos.

FITOTOXICIDAD:

Este producto no es fitotóxico en los cultivos y dosis aquí recomendados.

INCOMPATIBILIDAD:

Este producto por su origen biológico no se recomienda mezclar con otros productos agroquímicos, ya que su principal uso encamina a la producción orgánica

Manejo de Resistencia

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL

